



ケジラミ

うつるととってもカユイ虫

発生時期												
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

発生  多い 

大人の陰毛につく小さなシラミです。昔から国内にいましたが、最近では海外で感染してくる場合も多いようです。

形態と病害


シラミの中でも小型種で、カニに似た特異な形をしています。普通は、陰毛に寄生しますが、胸毛につくこともあります。まれに、子供にもみられ、まつ毛、まゆ毛につくことが知られています。吸血されると、激しいかゆみがあり、不快感と皮ふに青いはん点を残します。現在、日本ではシラミによる伝染病の発生は見られませんが、皮膚を掻いた結果炎症を起こし、そこから雑菌に感染することがあるので、注意が必要です。

予防

ケジラミは性行為によりうつります。予防方法は、保有者との性的接触をさけることです。家庭においては、衣類や寝具を介してうつることがあるので、注意が必要です。

対策

- 1) 陰毛をそります。
- 2) 人体散布用殺虫剤0.4%フェトリン粉剤（スミスリンパウダー等）を患部に散布します。
- 3) 特にひどい場合は、医師の指示による治療を受けます。



ケジラミ 体長1～1.5mm) 灰白～灰黒色



ケジラミの卵(大きさ0.4mm) 白色

(写真提供: 東京都)